



STATION POITOU-CHARENTES

000161 S.R.P.V.

13, ROUTE DE LA FORET

86580 BIARD

Bulletin n° 337 (03/97) 05 Février 1997

COLZA: Première capture de charançon de la tige en Vienne

COLZA: stade début C1

#### CHARANCONS DE LA TIGE

#### Situation

Une première capture a été enregistrée dans la Vienne à Sèvres Anxaumont. Même si celle-ci ne présente pas un caractère très significatif, on peut penser que le vol va se faire dès que les conditions climatiques vont être favorables (maxi de 10°, temps ensoleillé sans vent, ni pluie, et ceci pendant deux ou trois jours consécutifs).

Préconisation

Ne pas intervenir.

# **CEREALES D'HIVER**

#### DEGATS DU GEL

# Blé dur :

Le niveau des dégâts est très variable selon les parcelles (30 à 90 %).

## Orge d'hiver :

Des dégâts importants sont constatés pour la variété Gaelic (80 à 100 %).

# Orge de brasserie semis d'automne :

Les parcelles au stade 2-3 feuilles au moment du gel sont les plus touchées (80 à 100 %) notamment les variétés Nevada, Prisma.

### **MALADIES**

## Piétin-verse :

Plusieurs contaminations primaires se sont succédées du 5 Novembre au 22 Décembre.

A ce jour, la situation est comparables à celle de 1996 avec cependant un retard d'une dizaine de jours en ce qui concerne les dates probables de fin de latence (correspondant au déclenchement possible de contaminations secondaires).

## Piétin-verse et maladies foliaires :

Le prochain bulletin indiquera les premières tendances.

D3 40 J 4083C

P29